

PREPARATBEGRÄNSNINGAR



Preparat	Vindavdrifts-reducering	Bigiftigt	Fast skyddszon	Preparat-påfyllare	Tät hytt och kolfilterinsats
Acrobat	90 %				
Avaunt/Stewart		Ja			
Aviator Xpro					Ja
Basagran SG				Ja	
Beta-Baythroid		Ja			
Boxer					Ja
Cerone				Ja	
Danitron			10 m		
Delaro	50 %				
Elatus Plus	50 %				
Epok	75 %			Ja	Ja
Fastac	90 %	Ja			
Fenix	50 % (1)				
Fibro	50 %				
Forbel	50 %			Ja	Ja
Goltix WG					Ja
Gratil/Eagle	50 % (2)				
Hormotex				Ja	
Hussar Plus OD				Ja	
Karate		Ja			
Mavrik	90 % (3)				
MCPA 750				Ja	
Plenum		Ja			
Signum	25 % (4)				
Shirlan / Kunshi					Ja
Spotlight Plus	50 %				
Tomahawk 200				Ja	

- (1) = Gäller bara i potatis
- (2) = Gäller bete och slåttervall samt gräsfrö till utsäde.
- (3) = Gäller i huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli
- (4) = Gäller bara i plommon och körsbär

Bigiftig: Preparat som anses vara bigiftiga. Skall noteras i sprutjournalen om det finns blommor i fält.

Påfyllningsutrustning: Ska preparatsluss/påfyllare, sugspjut eller motsvarande användas.

Tät hytt: Tät ventilerad hytt med partikel- och kolfilterinsats krävs.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Minsta skyddsavstånd på mark vid bekämpning:

- 2 m Öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
- 6 m Sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
- 12 m Dricksvattenbrunnar

Skyddsavstånd vid plats för påfyllning, blandning eller spädning samt yttre rengöring av sprutan.

- 30 m Utomhus till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant, samt till dricksvattenbrunnar.
- 15 m Som ovan om **biobädd** eller **platta med uppsamlingsbrunn** används.