



Gullviks



final K[®]

Kalium för blad och frukt



Beskrivning

Final K är en flytande koncentrerad kaliumprodukt (K), 100% vattenlöslig växtnäring. Förhindrar och botar kaliumbrist.

Förtjänster

Kalium (K) gynnar :

Skörd : förbättrar tillväxthastighet och storlek
Kvalitet : högre sockerhalt (°Brix)
 mer färg (anthocyaner och carotenoider)
 bättre skalkvalitet (tjockare yttre cellväggar i epidermis)
 större kolhydrats-ackumulering (stärkelse).

Final K är en produkt utformad för att undvika antagonism med Ca⁺⁺ och Mg⁺⁺ joner förekommande i hårt vatten. Dessa minskar annars starkt verkan av kaliumgödsling.

Final K är en säker produkt att använda då den är fri från klor, svavel, nitrat och ammonium.

Sammansättning

Kalium (K ₂ O)	384 g/l	(26 % w/w)
Total kväve (N) i urea-form	45 g/l	(3 % w/w)

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende :	Flytande
Färg :	Färglös
Densitet :	1.5
pH :	12.5

▪ **EC FERTILIZER**

Vill du veta mer? Kontakta oss på Gullviks!
Du hittar oss på www.gullviks.se

Mer information?
Skanna QR-koderna här intill.



TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.
C/ Alcalá, 498. 2nd Floor. 28027 Madrid (Spain)
Tel.: +34 913 273 200 global@tradecorp.sapec.pt





Jordapplicering

REKOMMENDATION

Alla grödor	50 l/ha	Före plantering
--------------------	---------	-----------------

Blad och fruktapplicering

Betor	5-10 l/ha	Behandla vid 10-15 blad, före att beståndet slutit sig fullständigt.
Jordgubbar	4-5 x 2 l/ha	Behandla en gång före blomningen. Fortsätt under bärtillväxten.
Potatis	4 x 5 l/ha	Efter att raderna slutit sig och under knöluppbyggnaden.
Kärn- och stenfrukt (utom körsbär)	4 x 2,5 l/ha 4 x 3 l/ha	På balanserade träd. På träd med full sättnings, från kartsättning till 3-4 veckor före skörd.
Körsbär	2 x 3 l/ha 4-5 l/ha	Vid kartsättning och 10-15 dagar senare. Mellan skörd och bladfall.
Vindruvor	3 x 2-3 l/ha	Då druvorna nuddar varandra och mitten av mognaden.
Purjo	5 x 3-5 l/ha	Under tillväxt. Flest sprutningar på hösten.
Morot – Selleri	5 x 3 l/ha	Från 10-bladsstadiet och under tillväxt.
Kål – Blomkål	3 x 4-5 l/ha	Vid 6-bladsstadiet och under tillväxt.
Gurka – Squash	1 x 2 l/ha 3-5 x 2 l/ha	Före första blomman. frukttillväxt.
Tomater – Paprika – Aubergin	1 x 2 l/ha 3-5 x 2 l/ha	Före första blomman. Frukttillväxt.
Spenat	3 x 2-3 l/ha 4-5 x 2-3 l/ha	Var 10-de dag från att raderna slutit sig. I kortdagsproduktion. Avsluta 15 dagar före skörd.
Melon	2 x 3 l/ha	Från 6-bladsstadiet och begynnande frukttillväxt.

Blandnings och sprutförhållande

Kompatibel med de flesta gödselmedel och växtskyddsmedel som används. Testa en liten mängd före blandning i tanken. Blanda inte mer än två produkter i någon tankblandning. Spruta på torra blad och vid förväntat uppehållsväder i 3 till 4 timmar efter behandling för bästa effektivitet och inträngning.