



humifirst®

Humus- och fulvosyror



BESKRIVNING

Humifirst är ett flytande jordförbättringsmedel innehållande humus- och fulvosyror extraherade från amerikansk Leonardite. Dessa naturliga substanser härrör från sönderdelning av organiskt material och utgör den aktiva fraktionen av humus.

HUVUDSAKLIGA FÖRTJÄNSTER

Verkan av **Humifirst** i jorden

- ✓ Högre jonbyteskapacitet resulterar i bättre upptag av fosfor och låsta mikronäringsämnen (Fe, Mn, Cu, Zn)
- ✓ Ökad markluftningen för med sig bättre rot- och rothårsutveckling. Rothåren är särskilt viktiga för näringsupptaget.
- ✓ Förbättrar den vattenhållande kapaciteten.

Varför **Humifirst** ?

- ✓ Gynnar rotutvecklingen och förbättrar nytillväxten
- ✓ Minskar osmotiska stressen (torka, kyla, etc)
- ✓ Ökar skörden och dess kvalitet

SAMMANSÄTTNING

Totalt humusextrakt	165 g/l	(15.0 % w/w)
Humussyror	132 g/l	(12.0 % w/w)
Fulvosyror	33 g/l	(3.0 % w/w)

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

- Form: Flytande
- Färg: Svart
- Densitet : 1,1
- pH : 13

**Vill du veta mer? Kontakta oss på Gullviks!
Du hittar oss på www.gullviks.se**

Ta reda på mer om Humifirst
Skanna QR-koderna här intill



TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U.
C/ Alcalá, 498. 2nd Floor. 28027 Madrid (Spain)
Tel.: +34 913 273 200 global@tradecorp.sapec.pt





Humifirst
här för dina rötter

REKOMMENDERAD DOS

JORDTILLFÖRSEL

Bredsprutning	Alla grödor	50 l/ha före sådd, plantering, och omplantering, eller under uppkomst.
Avgränsad sprutning	Alla grödor	25 l/ha före sådd, plantering, omplantering, eller under uppkomst. Denna dos är särskilt rekommenderad för jordgubbar, gurkor och sparris.
jordinjektor, flytgödsling		25 till 30 l/ha efter plantering eller knoppsprickning i vin- och fruktodling. 1 till 2 liter per träd till prydnads- eller gatuträd.
Med bevattningssystem (dropp, pivot, sprinkler etc.	Växthus	5 till 6 x 5 l/ha med dropp, 3 till 4 dagar efter sådd eller plantering.
	På friland	2 till 3 x 15 l/ha, vid första bevattning efter sådd eller plantering.

Lämna ett intervall av 7 till 10 dagar mellan behandlingarna.
Använd mellan 200 och 2000 l vatten/ha vid spridningen.

DOPPING OCH BLÖTNING

Alla grödor Behandla rötterna med 5% lösning av Humifirst (5 l per 100 l vatten).

INBLANDNING I ODLINGSSUBSTRAT

Alla grödor Blanda in 3 till 4 liter av Humifirst homogent per m³ av odlingssubstratet. Om nödvändigt, späd först med vatten för att kunna blanda in Humifirst jämnare i odlingssubstratet.

BLANDBARHET

Blandbar med de flesta gödsel- och växtskyddsmedel utom surgörande produkter. Gör en blandningstest i liten skala före användning.