

Aminocal

Flytande, högkoncentrerad kalciumformulering för sen applikation för att förhindra skorv och för att förbättra lagringskvaliteten.

Innehåll

Kalciumkloridlösning (10,72 Ca) med mangan (Mn) och zink (Zn).
För bladgödsling.

% vikt/vikt			g/l
10,72	Ca	Kalcium	144,72
0,5	Mn	Mangan	6,7
0,5	Zn	Zink	6,7

Fysiokemiska egenskaper:

Densitet: 1,35 g/cm³
pH-värde: cirka 4
Färg: ljusbrun

De främsta fördelarna med Complestal Aminocal

- Högkoncentrerad flytande kalciumformulering för behandling före skörd och för reducering av lagringssjukdomar.
- Främjar fruktens färg strax före skörd.
- Förbättrar skördekväliteten.
- Fritt från mineralkväve för att förhindra en sen skottillväxt.
- Bidrar till maximal vidhäftning av sprutvätskan på frukt och blad.

Förvaring, försiktighetsåtgärder och ansvar:

När man förvarar produkten bör temperaturer under +5° C och över +40° C såväl som ofta förekommande temperaturfluktuationer undvikas. Betydande temperaturförändringar och/eller för låga temperaturer kan orsaka kristallisering. Kristallerna kommer dock att lösas upp lätt på nytt i spridningslösningen. Långvarig förvaring kan även orsaka färgförändringar och reversibel fassparation. Varken kristallisering eller färgförändringar påverkar produktens kvalitet vad gäller önskad fysiologisk effekt. Vid blandning av bekämpningsmedel för första gången, genomför ett test i liten skala före storskalig användning.

® = Registrerat varumärke för AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG



AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG
Heerdter Landstraße 199
D-40549 Düsseldorf (Germany)

Tfn: +49(0)2 11 5 06 42 37
Fax: +49(0)2 11 5 06 42 49
E-post: info@aglukon.com
Internet: www.aglukon.com

Distributör:
Bröderna Berner AB, Gullviks
Box 50132, 202 11 MALMÖ
Tel 040-680 68 20



Complesal Aminocal

Gröda	Tidpunkt	Dosering
Äpple*	3-4 behandlingar med början 3-5 veckor före skörd	5-8 l/ha
Stenfrukt	Körsbär: 3-5 behandlingar under stressande klvningstillstånd	5 l/ha
	Plommon: 4 behandlingar med början efter blomning och 30, 60 och 90 dagar efter blomning	5 l/ha
Jordgubbar	2-3 behandlingar tillsammans med Botrytis	5 l/ha
Bordsdruvor	Behandla upprepade gånger för att minska benägenheten för fysikaliska skador t.ex. bärklyvning	5 l/ha
Vindruvor	3 behandlingar tillsammans med fungicider i intervallet mellan fruktbildning och mognadsfasen	5 l/ha
Grönsaker	Öppet fält: enligt sortens behov	5 l/ha
	Skyddad odling: enligt sortens behov	0,20 - 0,25 %
Tomat, Paprika	3-5 behandlingar med början efter första blomningen Upprepa i intervall om 7-10 dagar	5 l/ha
Sallat	Börja behandlingen 2-3 veckor efter plantering Upprepa i intervall om 7-10 dagar för att minska benägenheten för fysikaliska skador	5 l/ha
Kål	Börja behandla tidigt, innan huvudet bildas Upprepa i intervall om 7-10 dagar för att minska benägenheten för fysikaliska skador	5 l/ha

*vattenvolym: 1,500 l/ha

