



Flexibel placering i sprutprogrammet
Säker effekt mot bladmögel och brunröta
Snabbt regnfast



PRODUKTINFORMATION

■ Verksamt ämne:
amisulbrom 200 g/liter

■ Förpackning:
5 liter

■ Dosering:
0,5 liter/hektar

■ Vattenmängd:
200-400 liter/hektar

Behandling får ej ske senare än
7 dagar före skörd.

EGENSKAPER

■ Verkningsätt:
kontaktverkande

■ Regnfasthet:
regnfasthet uppnås efter intorkning
(1-2 timmar)

ANVÄNDNING

Leimay som en del i bekämpnings-
programmet tillsammans med
andra preparat.

Under kraftig tillväxt och
vid högt sjukdomstryck är
behandlingsintervallen 5-7 dagar.

Under slutet av säsongen och
vid normalt sjukdomstryck är
behandlingsintervallen 7-10 dagar.

För att undvika uppkomsten
av resistenta stammar av
potatisbladmögel används Leimay
i högst tre (3) efterföljande
besprutningar och totalt i högst sex
(6) besprutningar per säsong.

Leimay är ett nytt preparat mot potatisbladmögel som utvecklats av
det japanska företaget Nissan Chemicals.

Gullviks ingår i Bröderna Berner AB och är Sveriges ledande företag
när det gäller växtskydd. Bröderna Berner AB är ett helägt dotterbolag
till Berner Aktiebolag med sitt huvudsäte i Helsingfors.





■ Snabbt regnfast

Leimay är regnfast omedelbart när sprutvätskan har torkat på bladet, vanligtvis inom 1-2 timmar efter besprutning. Det verksamma ämnet tas upp av växtens vaxlager och är därför skyddat från avrinning samt verksamt trots att det har regnat.

■ Förhindrar vidarespridning av sporer i beståndet

Leimay förhindrar effektivt groning av sporer, frigörelse av nya svärmsporer samt deras rörelseförmåga. Tack vare dessa egenskaper kan man stoppa smittospridningen i blasten, men också få utmärkt skydd mot brunröta.





■ Utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta

Leimay har under flera år varit i officiella försök i bl a Sverige, Finland och Lettland.

Leimay har visat sig ha utmärkt effekt mot både bladmögel och brunröta i dessa försök.

I diagrammen nedan syns ett medeltal av resultaten från de fem försök som utfördes av SLU under 2006-2007.



Förslag till bekämpningsprogram

BLOCK 1

Skydd av nyttillväxt

1. Leimay 0,5 l/ha
2. Epok 0,5 l/ha
3. Leimay 0,5 l/ha
4. Proxanil 2,0 +
Ranman Top 0,25 l/ha

BLOCK 2


Bladmögelskydd

5. Proxanil 2,0 +
Ranman Top 0,25 l/ha
6. Proxanil 2,0 +
Ranman Top 0,25 1,6 l/ha
7. Revus 0,6 l/ha
8. Ranman Top 0,5 l/ha

BLOCK 3

Brunröteskydd

9. Revus 0,6 l/h
10. Ranman Top 0,5 l/ha
11. Leimay 0,5 l/ha
12. Ranman Top 0,5 l/ha



Om smittotrycket är högt kan alla besprutningar i blocken utföras, men om smittotrycket är lägre kan man utelämna någon behandling. Resistenshanteringsregler för Leimay och Ranman Top: högst tre (3) efterföljande besprutningar, totalt högst sex (6) besprutningar per säsong.