



Ascofol



Biostimulant för bladgödsling

Koncentrerad algsuspension för stimulans av tillväxt och fruktbildning hos frukt och grönsaker.

BESKRIVNING

WUXAL Ascofol är en högkoncentrerad naturlig sjögräs-suspension som tagits fram ur brunalgen *Ascophyllum nodosum*. För att förhindra biologisk aktivitet bland de aktiva ingredienserna så skördas färskas produkter för hand och extraktet utvinns med en särskilt varsam extraheringsteknik. Lösningformeln ger en enklare hantering jämfört med pulverprodukter som vanligen löser upp sig långsamt och är mycket hygroskopiska. WUXAL Ascofol har en stimulerande effekt på plantorna vid fysiologisk stress under den tidiga tillväxtfasen. Den stimulerar tidig celledelning i fruktbildande grödor och ökar därigenom fruktstorleken. Det höga innehållet av mikronäringsämnen främjar fruktsättning och förbättrar skalkkvaliteten. Sjögräsextrakt som WUXAL Ascofol har dokumenterats i vetenskaplig litteratur som en förhöjare av effekten hos bekämpningsmedel. WUXAL Ascofol är rätt val för att förbättra både kvaliteten på småplantor och deras förmåga att överleva omplantering efter applicering på blad eller rötter. Internationella erfarenheter visar att sjögräsextrakt av högsta kvalitet som utvunnits ur *Ascophyllum nodosum* som WUXAL Ascofol verkar genom att öka resistensen hos växten mot svampsjukdomar som mjöldagg.

DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED WUXAL ASCOFOL

- Högkvalitativ algsuspension
- Förebygger mikronäringsbrist
- Ökad tillväxt vid stressade förhållande
- Förbättrad grödkvalitet
- Ökar effektiviteten av insekticider och herbicider
- Stimulerar växtens egna försvarsmekanismer mot skadegörare
- Fäster väldigt bra på bladytan
- Optimalt pH-värde för bladupptag

INNEHÅLL

Suspension av mikronäringsämnena Bor (B), Mangan (Mn) och Zink (Zn). För bladgödsling.

% vikt/vikt			g/l
3	B	Bor	38,1
0,8	Mn	Mangan	10,1
0,5	Zn	Zink	6,3

Alla näringsämnen är vattenlösliga.

FYSIOKEMISKA EGENSKAPER

Densitet: 1,27 g/cm³

pH-värde: cirka 6

Färg: mörkbrun



Uppnå den fulla potentialen
på myWUXAL.com



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN OCH DOSERING

Gröda	Tidpunkt	Dosering
Kärnfrukt	• blomningsstart / full blomning • blomningsslut / fruktstorlek 5-10 mm	2 l/ha 3 l/ha
Stenfrukt	• blomningsstart / kronbladen faller av • efter första fruktfällningen	3 l/ha 4 l/ha
Jordgubbar	tidig vartillväxt / första blomningen / första frukten	3 l/ha
Vete	tidig sidoskottsbildning / flaggbladet fullt utvecklat	1 l/ha
Tomat, Paprika, Melon, Aubergin, Gurka, Squash	4 behandlingar med början vid (första) blomningen i 14-dagarsintervall	2,5 l/ha eller 250 ml/hl
Morot, Lök, Purjolök, Rovor	2-3 veckor efter uppkomst / rottillväxt / 2 behandlingar med 14-dagarsintervall	2,5 l/ha
Broccoli, Blomkål, Vitkål	4-6-bladsstadiet / 10-14 dagar senare / huvudbildning	3 l/ha
Sparris	14 dagar efter skörd / cirka 3 veckor senare	5 l/ha

Ladda ner
etiketten här**FÖRVARING, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ANSVAR**

Temperaturen ska ligga mellan +5 °C och +30 °C. Större temperaturskillnader bör undvikas. Betydande temperaturförändringar och/eller för låga temperaturer kan orsaka kristallisering. Kristallerna kommer dock att lösas upp lätt på nytt i spridningslösningen. Långvarig förvaring kan även orsaka färgförändringar och reversibel fassparation. Varken kristallisering eller färgförändringar påverkar produktens kvalitet vad gäller önskad fysiologisk effekt. Vid blandning av bekämpningsmedel för första gången, genomför ett test i liten skala före storskalig användning. Då förvaring och applicering av gödningsmedel sker utom vår kontroll kan vi endast hållas ansvariga för att produkten är av tillfredställande kvalitet vid leveransen.

® = Registrerat varumärke