

Orius® 200 EW

- Behandling i raps



Produktfakta	Orius® 200 EW
Aktiv substans	200 g/l Tebuconazol
Användningsområde	Vete, korn, råg, rågvete, havre raps, och gräsfrö
Tid för användning	Verkningspektrum i raps Höstanvändning för tillväxtreglering/ bättre vinterhärdighet och mot stjälkröta/phoma. Våranvändning mot bomulsmögel, Alternaria spp och gråmögel.
Dos	0,425 - 1,25 L/ha
Godkänd behandlings tidpunkt	BBCH 14-69



Phoma: Bladsymptom i tidigt stadium



Bomulsmögel: Tidiga symptom



Värt att notera

Orius® 200 EW innehåller den beprövade aktiva substansen tebuconazol och är formulerad som ett praktiskt emulsionskoncentrat.

Tack vare Orius® 200 EW systemiska egenskaper möjliggörs en snabb fördelning av produkten med transpirationsströmmen så att en snabb effekt uppnås.



Verknings sätt

På viktiga svampsjukdomar i raps, främst rothals – och stjälkröta (Phoma lingam) och bomulsmögel (Sclerotinia) uppnås en god kontroll med Orius® 200 EW.

På hösten har Orius® 200 EW en tillväxtreglerande effekt som sänker tillväxtpunkten och ökar därmed vinterhärdigheten - samtidigt erhålls också effekt mot stjälkröta.

Vid behandling på våren med Orius® 200 EW fås en positiv inverkan på sidokottbildningen.

Gullviks



ORIOUS® 200 EW



Följ oss på Instagram
nufarm_sweden




nufarm.com/se

Nufarm

Grow a better tomorrow

Orius[®] 200 EW

- Behandling i raps



Användningsområde

Orius[®] 200 EW är en fungicid med ett brett användningsområde inom gruppen triazoler, med såväl förebyggande (skyddande) som stoppande (kurativ) effekt.

Tillväxtreglering i höstraps

Behandling på hösten med Orius[®] 200 EW leder till att oljeväxtplantans ovanjordiska delar inte växer lika mycket, tillväxtpunkten hålls nere och istället stimuleras rotttillväxten, vilket ger plantan bättre förutsättningar inför övervintringen.

Vid vårbehandling kommer Orius[®] 200 EW att hämma den apikala dominansen i det utvecklingsstadium plantan befinner sig i som behandlingen sker.

Vid behandling i blom förflyttas delar av tillväxten till blommor på sidogrenarna. Även ljusinsläppet förbättras ner i beståndet och stärker plantan mot liggsäd.

Rekommendationer i raps	Behandlings-tidpunkt	Dosering
Stråstyrka	BBCH 14-20	0,425 L/ha
Tillväxtreglering/ Vinterhårdighet	BBCH 14-20	0,425 L/ha
Rothals- och stjälskröta (Phoma)	BBCH 14-20	0,425 L/ha
Bomullsmögel (Sclerotinia)	BBCH 60-69	Höstraps 1,25 L/ha Våraps 1,175 L/ha

Gullviks



 **ORIOUS[®] 200 EW**

Läs alltid etiketten före användning. Växtskyddsmedel ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Var uppmärksam på etikettens varningstext och symboler. Nufarm är medlem i Svenskt Växtskydd.