

PREPARATBEGRÄNSNINGAR

Preparat	Vind- avdrifts- redu- cering	Bi- giftigt	Fast skydds- zon	Preparat- påfyllare	Tät hytt och kolfilter- insats
Amistar	50, 75 & 90 % (1)+(2)				
Ariane S					Ja
Ascra				Ja	Ja
Avaunt/Stewart		Ja			
Aviator Xpro					Ja
Basagran SG				Ja	
Boxer	OBS		OBS		Ja
Caryx				Ja	
Cerone				Ja	
Danitron	99 % (2)		10 m		
Delan WG / Pro	90 % (2)				
Elatus Era				Ja	
Elatus Plus	50 % (2)			Ja	
Fenix	50 % (2)+(6)				
Fibro	50 % (2)				
Folicur Xpert	50 % (2)				
Goltix WG					Ja
Gratil/Eagle	50 % (3)				
Hussar Plus OD				Ja	
Leander	75 % (2)+(8)				
Mavrik	90 % (4)				
MCPA 750				Ja	
Nexide	50 % (2)	Ja			
Raptol	75 & 50 % (7)				

PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

Preparat	Vind- avdrifts- redu- cering	Bi- giftigt	Fast skydds- zon	Preparat- påfyllare	Tät hytt och kolfilter- insats
Revytrex				Ja	
Sekator Plus OD	50 % (2)				
Signum	25 % (2)+(5)				
Shirlan / Kunshi					Ja
Syllit				Ja	
Spotlight Plus	50 %				
Tomahawk 200				Ja	

- (1) = 50 % vid gräsfrö till utsäde om (2). Vid tunnel- och frilandsodling av barrträdsplantor om (2): Dos <0,4=75 %. Dos >0,4=90 %
- (2) = Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken
- (3) = Gäller bete och slåttervall samt gräsfrö till utsäde
- (4) = Gäller i huvudkål, brysselkål, blomkål och broccoli
- (5) = Gäller bara i plommon och körsbär
- (6) = Gäller bara potatis
- (7) = Olika på olika grödor samt om bom eller fläktspruta. Se etikett.
- (8) = Endast vid dos >0,35 l/ha

OBS! För Boxer vid användning på hösten finns flera begränsningar.

- 1: Produkten får inte spridas närmare än 500 m från kommersiella odlingar som ska sköras samma höst och som har ätliga växtdelar ovan jord avsedda för humankonsumtion. Alltså i första hand frukt och grönsaker.**
- 2: Spridning skall göras mellan kl 18 och kl 03.**
- 3: Lufttemperaturen får vara högst 15 grader vid spridning.**
- 4: Fordonet skall ha tät förarhytt med ventilation som har partikel och kolfilter.**

PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

5: Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften med minst 75 % skall användas.

Bigiftig: Preparat som anses vara bigiftiga. Skall noteras i sprutjournalen om det finns blommor i fält.

Fast skyddszon: En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Zonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

Påfyllningsutrustning: Ska preparatsluss/påfyllare, sugspjut eller motsvarande användas.

Tät hytt: Tät ventilerad hytt med partikel- och kolfilterinsats krävs.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Minsta skyddsavstånd på mark vid bekämpning:

- 2 m Öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
- 6 m Sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
- 12 m Dricksvattenbrunnar

Skyddsavstånd vid plats för påfyllning, blandning eller spädning samt yttre rengöring av sprutan.

- 30 m Utomhus till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant, samt till dricksvattenbrunnar.
- 15 m Som ovan om **biobädd** eller **platta med uppsamlingsbrunn** används.