

Odlingsanvisning av NutriFibre



För produktion av högkvalitativt ensilage

För bästa resultat bör vallar med NutriFibre® hanteras på ett annat sätt än t.ex. engelskt rajgräs. Därför ger vi anvisningar nedan om hur fälten ska förberedas, vilken marktyp som passar bäst, tips om optimal gödsling samt korrekta skördemetoder.

Allt för att bidra till en hög foderavkastning. Denna odlingsanvisning av Nutrifibre innehåller all information du behöver för att få ut det mesta och bästa av ditt NutriFibre-gräs.



1. Krav gällande fälten

Ogrästryck	Välj ett fält med ett lågt ogrästryck eller använd en falsk såbädd
Markstruktur	Luckra vid behov upp djupare jordlager om rötterna ska kunna gå på djupet
Såbädd	Förbered en fast och fin såbädd



2. Rekommendationer vid sådd

Period för sådd	April-maj
Marktemperatur	Över 12 °C
Utsädesmängd	45-50 kg/ha
Sådjup	0,5-1,5 cm
Radavstånd	Mindre än 8 cm



3. Skötsel efter sådd

Etableringstiden	NutriFibre® växer långsamt i början eftersom den först skapar ett djupgående rotsystem, vilket ger en utmärkt tålighet mot torka.
Skötsel efter sådd (1)	Bekämpa örtogräs när gräset är högre än 5 cm.
Skötsel efter sådd (2)	Sprid inte ut slam eller stallgödsel mellan sådd och 1:a skörden.
Första skörden efter sådd	Den första skörden efter etablering bör göras innan gräset är 15 cm högt.
Skötsel på hösten	För optimal övervintring bör stubbhöjden på gräset vara 9-10 cm.



4. Gödslings per skörd och hektar*

Kväve (N)	90 kg**
Fosfor (P)	13 kg
Kalium (K)	80 kg
Magnesium (Mg)	6-17 kg
Kalkningsbehov (CaO)	128 kg per år

* Den exakta mängden varierar efter skördenivå och jordtyp. För en optimal gödselplan behövs en uppdaterad markkartering.

**NutriFibre kan vid tillval innehålla klöver. Om så är fallet, rekommenderas en lägre kvävegiva efter första skörden.



5. Avkastning*

Avkastning första året	2-12 ton TS/ha
Avkastning från andra året och framåt	Upp till 18 ton TS/ha

* Beroende på skötselintensitet och väderförutsättningar



6. Rekommendationer gällande skörd

Tidpunkt för skörd	3000-3500 kg TS/ha
Stubbhöjd	Över 8 cm
Skördeintervall	4-5 veckor
Torktid på fältet	NutriFibre® har en kortare torktid än engelskt rajgräs. Slå fält med NutriFibre sist och börja köra in dem först.
Vid packning av ensilaget	Torrsubstans bör vara under 30-35 % för att undvika mögelbildning
Tillsatsmedel	Använd tillsatsmedel (inokulanter) för optimal konservering

