

# PREPARATBEGRÄNSNINGAR

Preparat	Vind- avdrifts- redu- cering	Bi- giftigt	Preparat- påfyllare	Tät hytt och kolfilter- insats	Begrän- sad halm- hantering
Amistar	50, 75, 90 % (1)+(2)				
Ariane S				Ja	Ja (se etikett)
Ascra			Ja	Ja	
Aviator XPro				Ja	
Banjo				Ja	
Basagran SG			Ja		
Botiga			Ja		
Boxer / Purelo	OBS			Ja	
Caryx			Ja		
Cerone			Ja		
Danitron	99 % (2)	Ja			
Delan WG / Pro	90 % (2)				
Duplosan Max & D			Ja		
Elatus Era			Ja		
Elatus Plus	50 % (2)		Ja		
Fenix	50 % (2) & (5)				
Fibro	50 % (2)	Ja (7)			
Flurostar XL			Ja		
Folicur Xpert	50 % (2)				
Goltix WG				Ja	

## PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

Preparat	Vind- avdrifts- redu- cering	Bi- giftigt	Preparat- påfyllare	Tät hytt och kolfilter- insats	Begrän- sad halm- hantering
Gratil/ Eagle	50 % (3)				
Hussar Plus OD			Ja		
Leander	75 % (2) & (6)		Ja		
Mavrik	Ja (se etikett)				
Milbek- nock		Ja (8)			
Mospilan	50 % (9)				
Nexide CS	50 % (2)	Ja			
Raptol	75 & 50 % (5)	Ja			
Revytrex			Ja		
Sekator Plus OD	50 % (2)		Ja		
Signum	25 % (2)				
Shirlan / Kunshi				Ja	
Syllit			Ja		
Talius			Ja		
Teppeki		Ja			
Toma- hawk 200			Ja		
Tombo				Ja	Ja (se etikett)

## PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

- (1) = 50 % vid gräsfrö till utsäde om (2). Vid tunnel- och frilandsodling av barrträdsplantor om (2): Dos  $<0,4=75\%$ . Dos  $>0,4=90\%$
- (2) = Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken
- (3) = Gäller bete och slåttervall samt gräsfrö till utsäde
- (4) = ----
- (5) = Gäller bara i plommon och körsbär
- (6) = Gäller bara potatis
- (7) = Olika på olika grödor samt om bom eller fläktspruta. Se etikett.
- (8) = Endast vid dos  $>0,35$  l/ha
- (9) = Endast i prydnadsväxter

**OBS! För Boxer vid användning på hösten finns flera begränsningar.**

- 1: Produkten får inte spridas närmare än 500 m från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga växtdelar ovan jord avsedda för humankonsumtion. Alltså i första hand frukt och grönsaker.**
- 2: Spridning skall göras mellan kl 18 och kl 03.**
- 3: Lufttemperaturen får vara högst 15 grader vid spridning.**
- 4: Fordonet skall ha tät förarhytt med ventilation som har partikel och kolfilter.**
- 5: Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften med minst 90 % skall användas**
- 6: Körhastigheten vid spridning får maximalt vara 8 km/h.**

**Bigiftig:** Preparat som anses vara bigiftiga. Skall noteras i sprutjournalen om det finns blommor i fält.

**Fast skyddszon: En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas.** Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Zonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

**Påfyllningsutrustning:** Ska preparatsluss/påfyllare, sugspjut eller motsvarande användas.

**Tät hytt:** Tät ventilerad hytt med partikel- och kolfilterinsats krävs.

# PREPARATBEGRÄNSNINGAR forts

## ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

### Minsta skyddsavstånd på mark vid bekämpning:

- 2 m Öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
- 6 m Sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
- 12 m Dricksvattenbrunnar

### Skyddsavstånd vid plats för påfyllning, blandning eller spädning samt yttre rengöring av sprutan.

- 30 m Utomhus till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant, samt till dricksvattenbrunnar.
- 15 m Som ovan om **biobädd** eller **platta med uppsamlingsbrunn** används.